

La tecnica di Bristow-Latarjet nei re interventi per instabilità anteriore di spalla

www.fisiokinesiterapia.biz

Recidiva di instabilità dopo trattamento chirurgico:


- Per un nuovo **violento trauma**
- Per un **inadeguato trattamento** iniziale



Inadeguato trattamento iniziale

- **Diagnosi** non corretta
- **Errore** nella tecnica chirurgica
- **Incompleta** correzione delle lesioni anatomiche

Instabilità che ricompare in assenza di trauma e/o si ripresenta in forma diversa da quella inizialmente trattata.




Dal 1999 al 2003:

- **48 casi di instabilità** anteriore di spalla




Intervento di Bristow-Latarjet



Sette casi di recidiva di pregresso intervento:

- **5 Tecnica Artroscopica**
- **1 Tecnica di Putti-Platt**
- **1 Capsuloplastica Sec. Neer**



In cinque casi di recidiva di instabilità anteriore di spalla:

- **3 Calciatori**


- 1 Praticante **Body-Building**
- 1 **Rugbista**

Tecnica di Bristow-Latarjet

- “Triplo Blocco“
- “Blocco Osseo“



- Effetto di Contenzione Tendine Congiunto



La sutura della capsula e del legamento gleno-omerale inferiore al residuo del legamento coraco-acromiale determina:

- **Stabilizzazione** articolazione gleno-omerale
- **Recidiva** di lussazione < al 2%

- **Minima perdita** extrarotazione

Nei 41 casi trattati per instabilità anteriore di spalla: **zero recidive**

Tecnica di Bristow-Latarjet nelle Recidive

- Accurata **anamnesi**
- Dettagliato **Esame Clinico**

RX spalla


- **Antero-Posteriore**




- **Assiale**



- **Proiezione di Bernageau**



- **Presenza di “Bony Bankart” o di Lesione di Hill-Sachs**




- **Presenza di mezzi di sintesi o di artrosi gleno-omerale**




- **R.M.N. o Artro R.M.N.**



- Utilizzo di una sola vite malleolare parzialmente filettata di 4 mm con rondella




- Corretto posizionamento della coracoide



Risultati

- 6 ottimi e buoni




- **1 cattivo** per persistente rigidità e presenza di artrosi gleno-omerale



Conclusioni

Le recidive di instabilità anteriore di spalla sono, nella maggior parte dei casi, imputabili a un errore diagnostico per una sottostima delle lassità capsulari.



La **tecnica di Bristow-Latarjet** risulta, a nostro avviso, estremamente affidabile:

- **Assenza** pressoché completa di recidive
- **Recupero** eccellente particolarità spalla

