

# Fibroma condromixoide

- Tumore osseo benigno
- D = U

[WWW.FISIOKINESITERAPIA.BIZ](http://WWW.FISIOKINESITERAPIA.BIZ)

# Fibroma condromixoide

- Tumore osseo benigno
- D = U
- Raro (2% dei T. ossei benigni)

# Fibroma condromixoide

- Tumore osseo benigno
- D = U
- Raro (2% dei T. ossei benigni)
- Età: 10 - 20 anni, 1 caso su 2


Prima dei 30 anni, per 70% dei casi  
Possibile a 60 anni

# Fibroma condromixoide

- Tumore osseo benigno
- D = U
- Raro (2% dei T. ossei benigni)
- Età: 10 - 20 anni, 1 caso su 2  
Prima dei 30 anni, per 70% dei casi  
Possibile a 60 anni
- Sede : Estrietà di un osso lungo  
(75%)  
Arti inf. ++  
Tutte le localizz. possibili

# Fibroma condromixoide

- Localizzazioni:
- Metafisi delle ossa lunghe (75%)  
arti inf. : 75%




# Fibroma condromixoide

- **Dolori**
- **Tumefazioni**
- **Fratture patologiche**
- **Biologia : Neg.**

# Radiologia dei fibromi condromixoidi

---


- Lacune metafisarie eccentriche (1 - 8 cm)



# Radiologia dei fibromi condromixoidi

---


- Lacune metafisarie eccentriche (1 - 8 cm)
- Erosione della corticale (a volte soffiata)



# Radiologia dei fibromi condromixoidi


---

- Lacune metafisarie eccentriche (1 - 8 cm)
- Erosione della corticale (a volte soffiata)



# Radiologia dei fibromi condromixoidi


- **Lacune metafisarie eccentriche (1 - 8 cm)**
- **Erosione della corticale (a volte soffiata)**
- **Limiti netti con osteosclerosi reazionale**



# Radiologia dei fibromi condromixoidi

---

- **Lacune metafisarie eccentriche (1 - 8 cm)**
- **Erosione della corticale (a volte soffiata)**
- **Limiti netti con osteosclerosi reazionale**
- **Calcificazioni intra-tumorali (1/6)**



# Radiologia dei fibromi condromixoidi

---

- **Lacune metafisarie eccentriche (1 - 8 cm)**
- **Erosione della corticale (a volte soffiata)**
- **Limiti netti con osteosclerosi reazionale**
- **Calcificazioni intra-tumorali (1/6)**
- **Aspetto policiclico ,a volte (sulle ossa piatte)**





# Trattamento dei fibromi condromixoidi

---

- **Biopsia +++**

# Trattamento dei fibromi condromixoidi

- **Chirurgia conservativa**  
**Escissione completa o raschiamento + riempimento**



# Trattamento dei fibromi condromixoidi

- **Chirurgia conservativa**  
Escissione completa o raschiamento + riempimento




**Postop.**



**post 2 anni**

# Trattamento dei fibromi condromixoidi

- Escissione + riempimento



**U - 15 anni**



**Post op 2 anni**

# Trattamento dei fibromi condromixoidi

- Recidive : 25%
- Trasformazione maligna molto rara

**Ragazza - 14 anni 2°  
recidiva**

