www.fisiokinesiterapia.biz

Osteoartrosi: Generalità e Trattamento

OSTEOARTROSI

Definizione

Artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni *regressive* della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni delle altre strutture che comprendono l'articolazione (osso subcondrale, legamenti, capsula, membrana sinoviale, muscoli periarticolari, nervi sensitivi).

Deve essere intesa come insufficienza articolare!

Classificazione

a) Primaria o Idiopatica: fattore eziologico sistemico

- Localizzata
- Generalizzata (3 o più articolazioni)

b) Secondaria: fattore eziologico locale

Classificazione

a) **Primaria o Idiopatica:**

Localizzata

- **Mani**
 - Noduli di Heberden (IFD) e noduli di Bouchard (IFP) (nodulare)
 - Atrosi interfalangea erosiva (non nodulare)
 - Carpale: trapezio-metacarpica
- **Piedi**
 - Alluve valgo / rigido
 - Contrattura / Sublussazione (dita a martello)
 - Astragalo-scafoidea
- **Anca**
 - Eccentrica (superiore)
 - Concentrica (assiale, mediale)
 - Diffusa (Coxa senilis)

Classificazione

a) **Primaria o Idiopatica:**

Localizzata

- **Colonna vertebrale**
 - Articolazioni apofisarie
 - Articolazioni intervertebrali (dischi)
 - Legamentosa (iperostosi, malattia di Forestier, iperostosi scheletrica diffusa)
- **Altri siti specifici**
 - Gleno-omeroale
 - Acromionclaveare
 - Tibioastraglica
 - Sacroiliaca
 - Temporomandibolare

Classificazione

a) **Primaria o Idiopatica:**

Generalizzata

- Riguarda 3 o più delle regioni sopraelencate (Kellegren – Moore)

Classificazione

a) Secondaria :

- **Traumatica**
 - Acuta
 - Cronica (professionale, sportiva)
- **Congenita**
 - S.me di Legg-Calvè- Perthes
 - Lussazione congenita dell'anca
 - Epifisiolisi
- **Metabolica:**
 - Emocromatosi
 - Malattia di Wilson
 - Malattia di Gaucher
- **Endocrina:**
 - Acromegalia
 - Iperparatiroidismo
 - Diabete Mellito
 - Obesità
 - Ipotiroidismo

Classificazione

a) Secondaria :

- **Malattie da deposito di calcio**
- **Neuropatia** - Artropatia di Charcot
- **Altre malattie delle ossa**
 - Localizzate: frattura, necrosi avascolare, Infezione, gotta
 - Diffuse : AR, Malattia di Paget, Osteopetrosi, Osteocondrite
 - Congelamento
- **Varie:**
 - Malattie da decompressione
 - Emoglobinopatie

Struttura delle articolazioni

- Capi ossei articolari: tessuto osseo spugnoso che al di sotto della cartilagine articolare si condensa (**lamina ossea subcondrale**)
- Cartilagine articolare: altamente differenziato, dotato di particolari proprietà visco-elastiche per lo scivolamento dei capi articolari
- Membrana capsulo-sinoviale: membrana connettivale che collega i due capi articolari
 - *capsula articolare* (parte esterna): tessuto fibroso molto resistente ma poco elastico, si inserisce nel periostio; ricca di terminazioni nervose
 - *membrana sinoviale* (parte interna): si inserisce ai margini delle cartilagini articolari; ricca di vasi sanguigni e linfatici
- Menischi (ginocchio, sterno-claveare, temporo-mandibolare): permettono reciproco adattamento dei capi ossei articolari

La cartilagine articolare

- E' costituita da elementi cellulari, condrociti, disposti in lacune scavate entro l'abbondante sostanza fondamentale o *matrice ialina intercellulare* (proteoglicani)
- Immerse nella sostanza fondamentale, *le fibre collagene*
- In rapporto alla disposizione di condrociti e fibre collagene:
 - *lamina splendens* (più superficiale): sottilissime fibrille disposte // alla superficie libera
 - *strato superficiale o tangenziale*: rare cellule e fibre disposte // ed ortogonali
 - *strato intermedio o di transizione*: cellule arrotondate e fibre disposte disordinatam.
 - *strato profondo o radiale*: gruppi di cellule a disposizione colonnare e fibre grossolane disposte irregolarmente

La cartilagine articolare

- ***strato calcificato***: strato più profondo adiacente all'osso subcondrale con fibre collagene a disposizione verticale; il limite di calcificazione è ben visibile come una linea ondulata (**tide mark**)
- La superficie della cartilagine articolare non è liscia ma irregolare per intrappolare il liquido sinoviale
- La cartilagine articolare non è vascolarizzata ma riceve nutrimento dal liquido sinoviale

Prevalenza

- Causa più frequente dei disturbi reumatici
- OA del ginocchio principale causa di invalidità tra gli anziani statunitensi

<i>Malattie</i>	<i>N. casi</i>	<i>%</i>
Artrosi	3.500.000	63.61
Reumatismi fibromialgici	698.000	12.69
Artrite reumatoide	350.000	6.36
Gotta	246.000	4.47
Reumatismi secondari	167.000	3.03
Spondilite anchilosante	56.000	1.01
Connettiviti	17.000	0.31
Reumatismo articolare acuto	100	0.002
Altre reumopatie	468.000	8.50
TOTALE	5.502.100	100.00

Spese stimate per l'OA in Italia (dati in miliardi di lire)

<i>Voci di spesa</i>	<i>Per tutte le MR</i>	<i>Per l'artrosi</i>	<i>%</i>
Ricoveri ospedalieri	1.954	224	11.4
Farmaci	1.473	859	58.3
Prestazioni ambulatoriali	1.246	944	75.7
Terapia termale	73	70	95.8
Indennità di malattia	840	685	81.5
Invalidità	12.235	10.872	88.8
Totale	17.821	13.654	76.6

Prevalenza

- Alterazioni degenerative articolari praticamente sempre presenti oltre i 75 anni
- Epidemia di OA a causa del “baby boom”
(negli USA 56 milioni di individui sono nati tra il 1946 e il 1964)

**Aumento della
popolazione con
più di 65 aa di età :
Dal 1900 al 2050**

Prevalenza

Nella maggior parte dei casi interessa più di un'articolazione

Anomalie congenite o di sviluppo come principale fattore di rischio dell'anca (Malattia Legg-Calvè-Perthes, epifisiolisi femorale, displasia congenita)

I traumi, la meniscectomia, l'obesità, certe attività professionali ripetitive sono i principali fattori di rischio del ginocchio

Fattori di rischio

- **Età**
- **Sesso**
- **Grave trauma dell'articolazione**
- **Sforzi ripetuti e sovraccarico sull'articolazione***
- **Obesità**
- **Razza**
- **Fattori Genetici**
- **Anomalie congenite dello sviluppo**
- **Deficit muscolari periarticolari**
- **Precedenti malattie infiammatorie dell'articolazione**
- **Disturbi metabolici/endocrini**
- **Difetto propriocettivo**

Fattori di rischio

- Età, sesso, razza

- Età principale fattore di rischio per l'OA
- Prevalenza aumenta progressivamente con l'età
- OA ginocchio < 0,1% tra 25 - 34 aa
10 - 20% tra 65 -74 aa
- F:M = 2:1
- Donne di colore probabilità doppia rispetto a quelle bianche
- Incidenza OA del ginocchio: 30 % tra 65 -74 aa
- OA dell'anca lievemente meno diffusa di quella del ginocchio e

Popolazione	Età (anni)	Femmine (%)	Maschi (%)
Inglese	≥ 35	70	69
Caucasica USA	≥ 40	44	43
Eschimese dell'Alaska	≥ 40	24	22
Giamaicana (rurale)	35 a 64	62	54
Indiana Pima	≥ 30	74	56
Indiana Piedi Neri	≥ 30	74	61
Neri sudafricani	≥ 35	53	60
Media di 17 popolazioni	≥ 35	60	60

non presenta preponderanza femminile (differente eziologia!)

Prevalenza dell'AO in varie popolazioni

Fattori di rischio

- Età, sesso, razza

Effetto dell'età sulla prevalenza dell'artrosi

Fattori di rischio

- Traumi, stress ripetuti
 - Sono eventi causali dell'OA
 - Pz con frattura trimalleolare sarà quasi certamente colpito da OA alla caviglia
 - Perdita dell'integrità del LCA, danni al menisco, la meniscectomia provocano OA ginocchio (degradazione della cartilagine quando l'articolazione diviene instabile)

Prevenzione delle lesioni del ginocchio: < incidenza di OA del ginocchio di circa 25 % negli uomini e 15 % nelle donne

Fattori di rischio

- Traumi, stress ripetuti
 - Sovraccarico professionale o non professionale > di un'articolazione

Operai addetti al martello pneumatico: OA nella(e) articolazione(i) esposta(e) allo sforzo professionale ripetuto

Lavori che richiedono di inginocchiarsi, accovacciarsi, di chinarsi in modo ripetitivo: OA del ginocchio

Lavori agricoli: OA dell'anca

Fattori di rischio

- Traumi, stress ripetuti
- Il legame tra attività atletiche specifiche, se svolte nel tempo libero e non come professione, e l'OA è debole
- Invece atleti professionisti rischio maggiore di contrarre l'OA

Ex maratoneti e giocatori di tennis rischio 2 – 3 volte maggiore di riscontrare l'OA del ginocchio e dell'anca

Fattori di rischio

- Obesità

- Aumento massa corporea corrisponde aumento della prevalenza di OA.
- Molto meno evidente per l'anca che per il ginocchio
- **Obesità: rischio relativo 1,9 per gli uomini e 3,2 per le donne**

Eliminazione dell'obesità riduzione 25-50% dell'OA del ginocchio e 25% dell'anca

Perdita di 5 Kg: riduzione del 50% delle probabilità di sviluppare OA del ginocchio sintomatica

Fattori di rischio

- Deficit muscolare periarticolare
 - Ipostenia del quadricipite può costituire un fattore di rischio per l'OA (solitamente è secondario al minore utilizzo dell'arto dolorante)

Aumento nella forza di estensione del ginocchio pari a 10 libbre/piede

Riduzione del 20 % nella P di sviluppare OA radiografica del ginocchio

Riduzione del 29 % nella P di sviluppare OA del ginocchio sintomatica

Fattori di rischio

- Deficit muscolare periarticolare
 - **Ruolo del quadricipite**

Principale muscolo antigravitario dell'estremità inferiore

Funge da freno sul movimento pendolare dell'arto inf. ,
minimizzando le forze generate dal tallone sul terreno
durante la deambulazione

Importante stabilizzatore del ginocchio

Deficit di tale muscolo: carichi
eccessivi sull'articolazione

Fattori di rischio

- Genetici

- Incidenza globale noduli di Heberden 10 volte maggiore nelle donne che negli uomini
- Mutazione puntiforme cDNA che codifica collagene tipo II: (scambio arginina-cisteina posizione 519 catena fibrillare alfa) anomalia della condrodisplasia familiare ed OA poliarticolare secondaria

Genealogia di famiglia affetta da OA generalizzata e condrodisplasia lieve

Non sono state individuate anomalie genetiche in pazienti che presentano il quadro clinico di OA idiopatica dell'anca e del ginocchio

Fattori di rischio

- Densità ossea
 - OA ed Osteoporosi in rapporto inverso

L'osso subcondrale meno denso assorbe meglio il carico dell'osso normale

Stress minore sulla cartilagine articolare

Fattori di rischio

- Carenza di estrogeni

- Incidenza di OA > donne anziane che uomini anziani
- OA del ginocchio e anca nelle donne rapida progressione >50 aa (età della menopausa)
- Donne che assumono estrogeni diminuzione rischio dell'OA del 40%

Carenza di estrogeni aumenta il rischio di OA

Fattori di rischio

- Carenze nutrizionali

- Probabilità di progressione dell'OA è maggiore per livelli moderatamente bassi di 25 - idrossi vitamina D
- Carenza di Vitamina C aumenta rischio di OA (aumentano le specie reattive che danneggiano la cartilagine articolare)

La vit. C influenza la progressione dell'OA del ginocchio
ma non l'incidenza

Carenza Vit. C rischio 3 volte maggiore di
progressione di OA

Anatomia Patologica

- **Indebolimento, fibrillazione e possibile scomparsa della cartilagine articolare (più spesso nelle prime fasi)**
- **Eburneazione osso esposto**
- **Rimodellamento osseo**
- **Osteofiti**
- **Cisti sottocondrali**
- **Sinovite**
- **Ispessimento della capsula articolare**
- **Degenerazione meniscale**
- **Atrofia dei muscoli periarticolari**

Anatomia Patologica

Cartilagine articolare normale

Fornisce una superficie di supporto liscia, un osso scivola senza fatica sull'altro

Coefficiente di attrito 15 volte < a quella di due cubetti di ghiaccio che scivolino uno sull'altro

Ripartisce il carico durante la deambulazione

Proteoglicani, macromolecole della matrice responsabili dell'elasticità e della resistenza alla compressione.

Anatomia Patologica

Stadi precoci : *Alterazioni regressive a livello biochimico ed ultrastrutturale*

- Deplezione della sostanza fondamentale (depauperamento proteoglicani)
- Necrosi delle cellule degli strati cartilaginei più superficiali
- Compaiono irregolarità della *lamina splendens*

normale

- Si aggiungono piccole fissurazioni nelle lacune lasciate vuote dai condrociti degenerati
- E' da queste primitive soluzioni di continuità che prende avvio il fenomeno della fibrillazione

artrosi

Anatomia Patologica

Stadi precoci : *Alterazioni regressive a livello biochimico ed ultrastrutturale*

- I condrociti nelle aree danneggiate vanno incontro a proliferazione formando raggruppamenti cellulari (*gruppi esogeni*) con sintesi di collagene e proteoglicani
- Viene sintetizzato glicosamminoglicano tipo giovanile e collagene con fibrille tipo 1 (*riparazione ipertrofica*)
- Limitate possibilità di riparazione della cartilagine articolare in relazione al continuo agire delle cause
- La riparazione crea discontinuità tra le superfici articolari che favorisce scompaginamento di strati sempre più profondi (*carattere evolutivo*)

Anatomia Patologica

Stadi avanzati: *Alterazioni macroscopiche*

- Perdita integrità strutturale della cartilagine articolare e comparsa fessurazioni verticali (**fibrillazioni**)
- Con il movimento la cartilagine fessurata si logora: esposizione osso subcondrale

Fibrillazione e gruppi esogeni della cartilagine articolare nell'OA

Anatomia Patologica

Stadi avanzati: *Alterazioni macroscopiche*

- Nelle zone sottoposte a carico le trabecole dell'osso subcondrale aumentano di spessore dando fenomeni di *ostecondensazione*
- Sistema trabecolare più denso con formazione di osso molto compatto che assume il ruolo di superficie articolare (*eburnizzazione del capo articolare*)

Anatomia Patologica

Stadi avanzati: *Alterazioni macroscopiche*

- Cattiva distribuzione del carico determina microfratture trabecolari
- Il collasso delle trabecole portanti determina disturbi circolatori settoriali con fenomeni di necrosi e riassorbimento osseo (formazioni cavitare denominate *cisti, pseudocisti o geodi*)
- Cisti ricche di liquido sinoviale o tessuto fibroso o fibrocartilagineo
- Nelle zone non sottoposte a carico i vasi subcondrali penetrano nella cartilagine calcificata, processo di neoproduzione fibrocartilaginea (osteofiti)
- Gli osteofiti possono espandersi anche sopra la cartilagine originaria (tentativo di ricostruire la congruenza articolare)

Assottigliamento della cartilagine, microfratture trabecolari ed iniziale osteofitosi

Anatomia Patologica

Stadi avanzati

La liberazione nella cavità articolare di materiale degenerato costituisce una potente stimolazione per i sinoviociti (*funzione fagocitaria*)

Iperplasia villosa della sinoviale con infiltrazione di cellule mononucleate: *sinovite cronica disomogenea*

Ispessimento capsula articolare, versamento, perdita dell'elasticità con espansione di strutture come le borse che comunicano con lo spazio articolare (*cisti di Baker*)

Alterazione dei legamenti con dilatazione dei vasi ematici, aumento sintesi delle fibre collagene e dei proteoglicani con minore elasticità
Ipotrofia muscolare periarticolare

Ginocchio instabile con stress anomali sulle superfici articolari e ulteriori lesioni articolari

Fibrosi dell'endonervio e perinervio: *dolore cronico!*

Anatomia Patologica

Membrana sinoviale del ginocchio di un soggetto normale

Scomparsa della cartilagine, eburneazione dell'osso subcondrale, geodi

Iperplasia dello strato di cellule superficiali e marcata infiltrazione locale di linfociti e monociti (*Sinovite in ginocchio artrosico*)

Patogenesi

L'OA si sviluppa

Carichi normali
+
Biomateriali insufficienti
(p.es. cartilagine, osso, muscolo, legamenti)

Carichi eccessivi
+
Biomateriali normali

Patogenesi

Meccanismi di protezione dell'articolazione dallo sforzo

• Attiva

Muscoli

• Passiva

Osso subcondrale

Patogenesi

- Protezione Attiva

L'utilizzo dei muscoli e il movimento dell'articolazione responsabili dell'assorbimento del carico (di energia)

Lavoro negativo

Piccoli carichi inaspettati sono molto più dannosi per le articolazioni rispetto ai grandi carichi per i quali siamo preparati

Carico viene trasmesso all'osso e all'articolazione

Cadute di breve durata non concedono ai riflessi muscolari di entrare in azione (tempo di attivazione 75 msec)

Patogenesi

- Protezione Attiva

Ipotrofia muscolare

Aumento del periodo di latenza

Riduzione dell'efficacia di questo meccanismo

Patogenesi

• Protezione Passiva

L'osso subcondrale trabecolare è formato da una serie di trabecole longitudinali interconnesse che trasmettono lo stress da carico lungo l'asse longitudinale

E' osso elastico, spugnoso, assorbe l'energia e impedisce il sovraccarico della cartilagine articolare durante il carico

Nel caso di carichi eccessivi le trabecole subcondrali si fratturano e guariscono formando callo osseo

Trabecole più
rigide del normale !

L'osso non riesce più a deformarsi sotto carico, i carichi si concentrano nei punti di contatto della cartilagine articolare

Insufficienza funzionale !

Patogenesi

- Perdita di cartilagine

E' un fattore cruciale nella patogenesi dell'AO

La cartilagine si degrada lentamente ed il contenuto di proteoglicani diminuisce progressivamente

Usura, proteasi lisosomiali (catepsine) e *metalloproteasi neutre* (streptomelisina, collagenasi, gelatinasi) come principali fattori

Aumento sintesi di proteoglicani, collagene, acido ialuronico, DNA ed aumento attività catabolica (*riparazione ipertrofica*)

Questo meccanismo omeostatico mantiene l'articolazione in una condizione relativamente funzionale per anni

Tessuto riparativo non efficace come la normale cartilagine ialina nell'assorbimento dei carichi meccanici

Patogenesi

- Perdita di cartilagine

Aumento delle lesioni
cartilaginee

Tessuto cartilagineo
riparativo non efficace

Perdita a tutto spessore
della cartilagine

Condrociti non in
grado di mantenere la
matrice

Sintomi

Di che cosa si lamenta
il paziente?

- Dolore articolare
- Rigidità articolare
- Scroscio
- Alterazione del profilo articolare
- Deficit funzionale

Segni

- **Scroscio articolare**
- **Limitazione del movimento**
- **Dolorabilità alla mobilizzazione**
- **Aumento dei diametri ossei**
- **Tumefazione dei tessuti molli**
- **Zoppia**
- **Deformità**
- **Atrofia / ipostenia muscolare**
- **Aumento temperatura (+/-) versamento**
- **Instabilità**

Sintomi OA dell'anca

Caratteristiche del dolore:

- E' presente per mesi o anni e progredisce con molta lentezza
- Descritto come male profondo e sordo
- Localizzato all'articolazione e talora irradiato alla natica, regione trocanterica o ginocchio
- Aggravato dal movimento (lunghe passeggiate, prolungata stazione eretta, ripetuta salita e discesa di scale..) e alleviato dal riposo
- Inizialmente intermittente, col proseguire della malattia costante, più grave ed invalidante e compare per prestazioni funzionali di sempre minore impegno
- Con il proseguire della malattia i movimenti dell'anca si fanno sempre più limitati e dolorosi (abduzione ed extratorazione)

Obiettività OA dell'anca

Dolore esacerbato da alcune manovre:

Manovra di Lèri

Manovra di Patrick

Manovra di Forestier

Sintomi OA del ginocchio

Caratteristiche del dolore:

- **Dolore come sintomo principale**
- **Riferito nelle forme iniziali in sede retropatellare o mediale**
- **E' particolarmente intenso dopo che l'articolazione è stata a lungo immobilizzata, regredisce quando l'articolazione si è "scaldata"**
- **Aggravato dalla flessione - estensione estrema**
- **Mancano fenomeni di blocco**
- **Nelle fasi avanzate il dolore può impedire la deambulazione, raramente la limitazione funzionale diventa completa**

Obiettività OA del ginocchio

Ballottamento rotuleo

Manovra per evidenziare il crepitio

Artrocentesi

Sintomi

Origine del dolore:

Tessuto	Meccanismo che causa il dolore
Osso subcondrale	Ipertensione midollare, microfratture
Osteofiti	Stiramento delle terminazioni nervose nel periostio
Legamenti	Stiramento
Entesi	Infiammazione
Capsula articolare	Infiammazione, distensione
Muscolatura periarticolare	Contrattura
Sinoviale	Infiammazione

La cartilagine articolare non è innervata!

Analisi del liquido sinoviale

Diagnosi	Aspetto	Viscosità	Conteggio dei leucociti/mm ³				Differenza nella concentrazione del glucosio (Sangue e liquido sinoviale mg/dl)
					% di leucociti polimorfonucleari		
					Test mucinico	Cristalli	
Normale	Giallo trasparente	Normale	< 200	7	Buono	-	0
Osteoartrosi	Trasparente o torbido	Ridotta	600	13	Buono	†	5
Artrosi traumatica	Trasparente o ematico	Ridotta	1500	20	Buono	-	5
Gotta	Torbido	Ridotta	21,500	70	Scarso	Urato di monosodio	11
Pseudogotta	Leggermente torbido	Leggermente ridotta	14,200	68	Discreto	Pirofosfato di calcio diidrato (CPPD)	-
Artrite reumatoide	Torbido	Ridotta	1900	66	Discreto-scarso	Raro	30
Infezione batterica acuta dell'articolazione	Molto torbido	Ridotta	80,000	90	Scarso	-	91

Abbreviazioni: OA, Osteoartrosi

Infiammazione sinoviale molto lieve!

Esame radiologico

Rx effettuate in posizione eretta!

*Discrepanza tra Rx e reale
presenza di sintomi, il 30%!*

- **Riduzione della rima articolare (perdita cartilagine articolare)**
- **Cisti Subcondrali (geodi)**
- **Sclerosi ossea subcondrale**
- **Osteofiti marginali**

Esame radiologico

Esame radiologico

TC e RM in casi particolari: OA vertebrali per la valutazione dei diametri del canale vertebrale e di compressioni mielo-midollari

Trattamento

Il trattamento ottimale dell'OA richiede una
combinazione di trattamenti farmacologici e non
farmacologici

Non farmacologico

Esercizio aerobico

Potenziamento muscolare

Dimagrimento

Termoterapia

Solette a cuneo

Educazione del paziente

Farmacologico

Trattamento

Esercizio aerobico

Riduzione del deficit e miglioramento della funzionalità

cioè

- Riduzione del dolore
- Aumento dell'ampiezza del movimento (ROM)
- Potenziamento muscolare
- Miglioramento delle attiv. quotidiane
- Dimagrimento

Protezione dell'articolazione da ulteriori danni

Prevenzione dell'invalidità e dei disturbi secondari dovuti alla inattività

Trattamento

Esercizio aerobico

- Deambulazione
- Ciclismo
- Nuoto
- Danza aerobica
- Esercizi aerobici in piscina

Trattamento

Esercizio aerobico

- Deambulazione

30' 3 volte / settimana

60 – 80% della frequenza cardiaca ottimale

Miglioramento distanza percorsa

Riduzione del dolore!

Utili calzature adeguate, superfici morbide, a volte uso di bastone

Trattamento

Potenziamento muscolare

- Riduzione del carico meccanico
- Stabilizzazione dell'articolazione

*Mantenere questa
posizione 5''*

Esercizi per potenziamento del quadricipite

Totale giornaliero: 15 ripetizioni per serie X 7 serie = 105

Trattamento

Dimagrimento

- Riduzione del carico meccanico
- Riduzione dolore
- Miglioramento della funzione articolare

Trattamento

Termoterapia

Calore

- Riduce la contrattura
- Riduce il dolore articolare

- Termoforo a temperature medie-basse
- Da utilizzare prima degli esercizi isometrici
- Non sdraiarsi sullo scaldino per evitare ustioni
- 15-20 min. a volta
- Non applicare calore sopra una zona con protesi

Trattamento

Termoterapia

Freddo

Alleviare il dolore dopo sforzi

- Impacchi di ghiaccio
- Massaggi con ghiaccio
- Spray locali

Trattamento

Solette a cuneo

Stadi precoci dell' OA del compartimento femorotibiale mediale

Riduzione del dolore

Trattamento

Educazione del paziente (economia articolare)

- **Indossare scarpe ammortizzate che calzino adeguatamente**
- **Stare seduti piuttosto che in piedi per attività che durino più di 10 min.**
- **Disponete gli oggetti che usate più frequentemente in luoghi dove potete raggiungerli senza accucciarsi o inginocchiarsi**
- **Utilizzare un attrezzo dotato di manico lungo per raccogliere oggetti dal pavimento**
- **Parcheggiare la macchina vicino al luogo di destinazione**
- **Evitare :**
 - **Sedie basse**
 - **Letti bassi**
 - **Toilette basse**
 - **Vasche da bagno**
 - **Fare le scale**
- **Utilizzare tutori dal lato sano per ridurre il carico nel lato malato**

Trattamento farmacologico

- **Paracetamolo e FANS**
- **Analgesici centrali ed Oppiacei**
- **Iniezione intrarticolare di corticosteroidi**
- **Iniezione intrarticolare di acido ialuronico**

Trattamento

FANS

Inibiscono la sintesi delle Prostaglandine mediante l'inibizione della ciclossigenasi (COX)

**Analgesici periferici
non acidi**

Paracetamolo

Metamizolo

Ketorolac

**Fans acidi – Aspirino
simili**

Acido acetilsalicilico

DiFlunisal

Trattamento

FANS

**Fans acidi –
Non Aspirino simili –
Non Cox2 selettivi**

Ibuprofene
Indometacina
Piroxicam
Naprossene
Ketoprofene
Diclofenac

**Fans acidi –
Non Aspirino simili –
Cox2 preferenziali**

Meloxicam
Lornoxicam
Aceclofenac
Nimesulide
Celecoxib

Isoenzima COX1 : **Trattamento**

Normalmente presente nei tessuti, dove stimola la produzione di PG che regolano le normali attività cellulari, contribuendo a processi fisiologici quali la *citoprotezione gastroenterica*, il *flusso renale* e l'*aggregazione piastrinica*

effetti
collaterali

- *Gastrolesività: dispepsia, pirosi, lesioni della mucosa (erosioni, ulcere), emorragia e perforazione gastrica*
- *Allungamento tempo di sanguinamento (gg dopo trattamento con acido acetilsalicidico, ore per alcuni Fans)*
- *IRA può precipitare in pazienti con cardiopatia oppure nefropatia*
- *Reazioni allergiche*
- *Maggiore formazione SRS-A con broncostrizione (tutti gli acidi che inibiscono COX)*

Trattamento

Isoenzima COX2

Viene espressa in corso di infiammazione sotto lo stimolo di fattori mitogeni e citochine

effetto

Analgesico
Antinfiammatorio
Antipiretico

Trattamento

Isoenzima COX3

Scoperto negli USA nel 2002

Coinvolta nella genesi del dolore e della febbre

Ancora prematuro pensare ad una terza generazione di farmaci

Trattamento

Rapporto tra la concentrazione che inibisce il 50% (IC₅₀) della ciclossigenasi-2 rispetto al IC₅₀ della ciclossigenasi-1 nel sangue intero

Rapporto < 1 indica la selettività per la COX2

Effetti terapeutici

FANS	Rapporto *
Flurbiprofene	10.27
Ketoprofene	8.16
Fenoprofene	5.14
Tolmetina	3.93
Aspirina	3.12
Oxaprozina	2.52
Naprossene	1.79
Indometacina	1.78
Ibuprofene	1.69
Ketorolac	1.74
Piroxicam	0.79
Nabumetone, 6.MNA	0.64
Etodolac	0.11
Celecoxib	0.11
Meloxicam	0.09
Acido mefenamico	0.08
Diclofenac	0.05
Rofecoxib	0.05
Nimesulide	0.04

Trattamento

PARACETAMOLO

- Ha attività antipiretiche ed analgesiche ma non antiflogistiche
- Inibisce la sintesi di PG nel SNC
- Inibitore debole della COX ed in assenza di perossido (per questo ha scarsa attività antinfiammatoria)
- Per la sua efficacia e tollerabilità il paracetamolo (fino a 3 gr./die) è **l'analgesico da utilizzare come prima scelta** nel dolore dell'OA
- Se efficace può essere adoperato anche a lungo termine
- In caso di eccessivo dosaggio epatotossicità

Trattamento

I FANS alle dosi efficaci minori e per il più breve tempo possibile, devono essere presi in considerazione in associazione o in alternativa nei pazienti che non rispondono al paracetamolo

Trattamento

Oppiacei

Utili alternative in pazienti in cui i FANS o i Coxib sono controindicati, inefficaci e/o scarsamente tollerati

Effetti collaterali

Confusione mentale

Nausea

Vomito

Ritenzione urinaria

Sonnolenza

Depressione
respiratoria

Costipazione

Trattamento

Iniezione intrarticolare di steroidi

Quando?

**Non trova
indicazione di routine**

- **Non reagiscono ad altre terapie conservative**
- **Non vogliono/non possono sottoporsi ad intervento chirurgico**

Attenzione!

- **Durata 2 settimane**
- **Atrofia di cute e sottocute in siti superficiali**
- **Iniezioni frequenti danneggiano l'articolazione**
- **Eccessivo carico sull'articolazione**
- **Infezioni**

Trattamento

Iniezione intrarticolare di Acido ialuronico

- **Costituente del liquido sinoviale**
- **Agisce come lubrificante viscoso durante movimento lento, come ammortizzatore elastico durante movimento rapido**

Diminuzione del dolore

Aumento della funzionalità

Il medico deve valutare

**I pazienti più idonei da trattare
Convenienza farmacocinetica**

Trattamento chirurgico

Quando?

Strategie farmacologiche e non farmacologiche risultano inefficaci

- Osteotomie
- Artroprotesi
- Artrodesi

Trattamento chirurgico

Protesi totale

Protesi di rivestimento

Trattamento chirurgico

Protesi monocompartimentali

Pre operatorio

Post operatorio

Trattamento chirurgico

Pre operatorio

Protesi totali

Post operatorio

Trattamento chirurgico

Osteotomia di sottrazione esterna

Lama-placca "collo-di-cigno" (Descamps)

Trattamento chirurgico

Artrodesi nella rizartriosi