Assorbimento dei lipidi presenti nella dieta

Struttura molecolare di un chilomicrone

Il diametro della particella dei chilomicroni
Varia da circa 100 a circa 500 nm

Ingresso nella glicolisi del glicerolo prodotto dalla demolizione dei triacilgliceroli

www.fisiokinesiterapia.biz

La β ossidazione

Conversione di un acido grasso in acil-CoA. E' una reazione di attivazione

Ingresso degli acidi grassi nei mitocondri attraverso il trasportatore acil-carnitina/carnitina

L'aciltransferasi I viene inibita da malonil-CoA, il primo intermedio nella sintesi degli acidi grassi. Questa inibizione impedisce la simultaneità di sintesi e degradazione degli acidi grassi.

Fasi dell'ossidazione degli acidi grassi

1 la lunga catena degli ac. grassi viene ossidata e rotta in unità a due atomi di carbonio sotto forma di acetil-CoA.

2 i gruppi acetilici vengono ossidati a CO_2 nel ciclo dell'acido citrico.

3 gli elettroni sottratti in queste ossidazioni sono trasferiti all'ossigeno dalla catena respiratoria; durante questo processo viene rilasciata una quantità di energia sufficiente per la sintesi di ATP attraverso la fosforilazione ossidativa

Via di ossidazione degli acidi grassi

a) in ogni passaggio attraverso questa sequenza di quattro reazioni viene staccata dall'estremità carbossilica della catena dell'ac. grasso un'unità acetilica sotto forma di acetil-CoA.

b) Altri sei passaggi producono altre 7 molecole di acetil-CoA. La settima deriva dagli ultimi due atomi di carbonio della molecole di acetil-CoA.

Formazione dei corpi chetonici dall'acetil-CoA.

Gli individui che seguono una dieta equilibrata Producono corpi chetonici in piccole quantità. In alcune circostanze, che determinano un accumulo di acetil-CoA, la tiolasi catalizza la condensazione di due molecole di acetil-CoA formando acetoacetil-CoA, precursore dei tre corpi chetonici.

**Il D-β-idrossibutirrato
 sintetizzato nel fegato
 viene trasportato dal
 flusso sanguigno agli
 altri tessuti dove viene
 convertito in acetil-CoA**

Formazione ed esportazione dei corpi chetonici