


Rappresentazione schematica delle principali deformità della mano reumatoide nel corso della malattia non efficacemente trattata




“en boutonniere” (ad asola)

“swan neck” (collo di cigno)

dito “a martello”

Deviazione ulnare “a colpo di vento” e “pollice a Z”

www.fisiokinesiterapia.biz



www.fisiokinesiterapia.biz



www.fisiokinesiterapia.biz



www.fisiokinesiterapia.biz









Artrite reumatoide: manifestazioni periarticolari

- Tenosinoviti essudative e stenosanti
- Sindromi canalicolari (tunnel carpale, tarsale etc.)
- Rotture tendinee
- Borsiti, cisti sinoviali
- Rottura cisti poplitea
- Compressione midollare cervicale

www.fisiokinesiterapia.biz



Cisti poplitea




Max. ESTENSIONE

Max. FLESSIONE



Interessamento atlo-epistrofico con lussazione



Artrite reumatoide

manifestazioni extra-articolari

- Anemia delle malattie croniche
- Noduli reumatoidi
- Sindrome secca (s. di Sjögren)
- Neuropatia periferica
- Pneumopatia interstiziale
- Sierositi
- Episclerite, sclerite, scleromalacia
- Leucopenia, splenomegalia (s.di Felty)
- Vasculite necrotizzante (porpora, ulcere cutanee etc.)
- **ATEROSCLEROSI ACCELERATA**

Noduli reumatoidi




Erosioni iniziali (1 anno dall'esordio di malattia)





EROSIONE iniziale (6 settimane di malattia) visibile in RMN ma non in RX convenzionale



Marcatori biologici nell'AR

- Risposta di fase acuta (indici di flogosi)
- Autoanticorpi