EMORROIDI

www.fisiokinesiterapia.biz

LO SAPEVI CHE...?

- *le “emorroidi” sono una delle indisposizioni più frequenti*
- *più della metà della popolazione svilupperà “emorroidi”, di solito dopo i 30 anni*
- *milioni di persone attualmente soffrono di “emorroidi”*

LO SAPEVI CHE...?

- *la maggior parte delle persone soffre in silenzio per un lungo periodo prima di cercare aiuto*

COSA SONO?

- Le **emorroidi** sono una formazione anatomica normale, esistente dalla nascita e perciò verosimilmente utile, di natura vascolare artero-venosa
- Contribuiscono al meccanismo della continenza
- Occorre perciò distinguere fra emorroidi e **malattia emorroidaria**

COSA SONO?

- Sono distribuite in 3 gruppi principali corrispondenti ai rami terminali dell’arteria emorroidaria superiore

- Laterale sn, anteriore dx, posteriore dx

MALATTIA EMORROIDARIA

- Sanguinamento
- Prolasso
- Dolore

Malattia emorroidaria

- **Sanguinamento**
- Prolasso
- Dolore

Malattia emorroidaria

- Sanguinamento
- **Prolasso**
- Dolore



Malattia emorroidaria

- Sanguinamento
- Prolasso
- **Dolore**

Malattia emorroidaria

- Sanguinamento
- Prolasso
- **Dolore**

CAUSE

- ***La causa esatta è ignota***
- **Ereditarietà**
- **Alimentazione**
- **Stipsi cronica o diarrea**
- **Sforzo durante l'evacuazione**
- **Posizione abituale**
- **Fattori endocrino-genitali (pillola, ovulazione, mestruazioni, gravidanza)**
- **Sport particolari (equitazione, pesi, ciclismo)**

DIAGNOSI



DIAGNOSI
Visita proctologica + anoscopia

- ***Posizione di Sims***
- Ispezione
- Esplorazione rettale
- Anoscopia



DIAGNOSI









DIAGNOSI

DIAGNOSI



DIAGNOSI

CLASSIFICAZIONE
Visita proctologica + anoscopia

- Emorroidi di I grado
- Emorroidi di II grado
- Emorroidi di III grado
- Emorroidi di IV grado

CLASSIFICAZIONE

- **<u>Emorroidi di I grado</u>**
- Aumento di volume di 1 o più pacchetti, sotto ponzamento, con iniziale impegno del canale anale



CLASSIFICAZIONE

- **<u>Emorroidi di II grado</u>**
- Procidenza iniziale di 1 o più pacchetti, sotto ponzamento, con risalita spontanea nel canale anale



CLASSIFICAZIONE

- **<u>Emorroidi di III grado</u>**
- Prolasso di 1 o più pacchetti, con necessità di riduzione manuale



CLASSIFICAZIONE

- **<u>Emorroidi di IV grado</u>**
- Prolasso permanente e irriducibile di 1 o più pacchetti



TERAPIA MEDICA

- Mantenere feci morbide
- Semicupi con acqua tiepida
- ***Bioflavonoidi*** (esperidina,diosmina)
- Sintomatici
- www.google.it

TERAPIA AMBULATORIALE

LEGATURA ELASTICA

- Efficace
- Ripetibile
- Non dolorosa



TERAPIA AMBULATORIALE

LEGATURA ELASTICA

- Emorroidi di I-II grado sintomatiche
- Emorroidi di III grado (1 solo pacchetto)



TERAPIA AMBULATORIALE

SCLEROTERAPIA

- può essere usata anche su emorroidi sanguinanti che non prolassano. Relativamente indolore e comporta una sclerosi delle emorroidi

CRIOTERAPIA

- popolare 20 anni fa, consiste nel congelare il tessuto emorroidario provocandone così la distruzione

TERAPIA

Dearterializzazione Emorroidaria Transanale (THD)

- Nel 1994 il prof. ***Morinaga*** (Giappone) ha ideato e proposto nuova tecnica, che consiste nella semplice legatura dei vasi arteriosi che afferiscono ai cuscinetti emorroidari, nel canale anale superiore, sulla guida di una sonda doppler.



TERAPIA CHIRURGICA

TERAPIA CHIRURGICA

- **INDICAZIONI CHIRURGICHE**

- Emorroidi III-IV grado
- Emorroidi II grado sanguinanti resistenti al trattamento medico
- Trombosi emoroidarie recidivanti

- **OBBIETTIVI**

- Estirpazione tessuto emorroidario
- Rispetto della fisiologia del canale anale
- Controllo delle sequele dolorose post-operatorie

TERAPIE CHIRURGICHE

- ***Milligan-Morgan***
- Ferguson (USA)

- ***PPH*** (Procedure for Prolapse and Hemorrhoids)

MILLIGAN-MORGAN





MILLIGAN-MORGAN





MILLIGAN-MORGAN

PPH-LONGO TECHNIQUE

PPH-LONGO TECHNIQUE

PPH-LONGO TECHNIQUE





PPH-LONGO TECHNIQUE





PPH-LONGO TECHNIQUE







EMORROIDI-CANCRO?

- Non ci sono relazioni tra emorroidi e cancro dell'ano
- Sintomatologia simile

EMORROIDI-CANCRO?