

CISTI EPATICHE SEMPLICI

**NEOFORMAZIONI BENIGNE DEL FEGATO
A CONTENUTO LIQUIDO, CAPSULATE**

NON IN COMUNICAZIONE CON LE VIE BILIARI

PREVALENZA: 1-3% DELLA POPOLAZIONE

www.fisiokinesiterapia.biz

CISTI EPATICHE SEMPLICI

IN GENERE ASINTOMATICHE

SINTOMI :

DA COMPRESSIONE IN CASO DI CISTI MOLTO GRANDI



IN CASO DI COMPLICANZE: ROTTURA, EMORRAGIA INTRACISTICA, INFEZIONE

CISTI EPATICHE SEMPLICI

DIAGNOSI FACILE : ECO, TC


**(FORMAZIONI LIQUIDE SENZA
COMUNICAZIONI CON LE VB)**

D.D. CISTI IDATIDEA “GIOVANE” / CISTOADENOMA









CISTI EPATICHE SEMPLICI

RISCHIO EVOLUTIVO: NULLO

TRATTAMENTO : FENESTRAZIONE LAPAROSCOPICA

RISCHIO OPERATORIO: BASSO MA RECIDIVE

CISTI EPATICHE SEMPLICI

DIAGNOSI FACILE (FORMAZIONI LIQUIDE SENZA
COMUNICAZIONI CON VB)

D.D. CISTI IDATIDEA “GIOVANE” / CISTOADENOMA

SINTOMI: RARAMENTE E SOLO NELLE FORME MOLTO
GRANDI (L'EMORRAGIA INTRACISTICA E' RARA,
NON RICHIEDE NESSUN TRATTAMENTO IN URGENZA)

CISTI EPATICHE SEMPLICI

RISCHIO EVOLUTIVO: NULLO

RISCHIO OPERATORIO:

BASSO / ATTENZIONE ALLE RECIDIVE

CISTI EPATICHE SEMPLICI

LE INDICAZIONI AD UN INTERVENTO
CHIRURGICO SONO MOLTO RARE

L'INTERVENTO DI SCELTA E' LA
FENESTRAZIONE PER VIA LAPAROSCOPICA

POLICISTOSI EPATICA

ASSOCIATA NEL 50% DEI CASI A POLICISTOSI RENALE

ECCEZIONALI L' INSUFFICIENZA EPATICA
E L' IPERTENSIONE PORTALE
POSSIBILE L' INSUFFICIENZA RENALE

INDICAZIONI ALL' INTERVENTO:
QUANDO IL VOLUME RAGGIUNTO DAL FEGATO
PEGGIORA LA QUALITA' DI VITA DEL PAZIENTE

RISCHIO OPERATORIO ELEVATO
(EMORRAGIE I.O. - ASCITE POSTOPERATORIA)

POLICISTOSI EPATICA (P.E.)

LE INDICAZIONI AD UN INTERVENTO CHIRURGICO SONO RARE.

L' INTERVENTO DI SCELTA E' LA FENESTRAZIONE *sec.* LIN.

LA RESEZIONE E' A VOLTE INDICATA NELLE FORME CHE SOSTITUISCONO INTERAMENTE UNO O PIU' SEGMENTI.
