La sostanza intercellulare

1. Fibre collagene di I tipo (< 1/3 del peso complessivo)
 - resistono alla flessione ma non alla compressione
 - supporto organico alla formazione dell'idrossiapatite
2. Diversi sali minerali, tra cui preponderante l'idrossiapatite (matrice inorganica) (2/3 del peso complessivo)
 - 3 molecole di fosfato di Ca + 1 molecola di idrossido di Ca eptaidrato
 - incorpora anche altri sali e ioni
 - resiste alla compressione ma non alla flessione
3. Osteomucoide (formato da: a) proteine adesive quali osteocalcina, osteopontina, sialoproteine ossee; e b) aggreganti)

N.B.: le cellule rappresentano solo il 2% del peso complessivo dell'osso

SINTESI DEL COLLAGENE

SINTESI DELLE CONDRUMUCOPROTEINE

Escissione dei telopeptidi

Formazione di fibre
Legame crociato

Struttura primaria della molecola collagenica (una molecola di glicina ogni tre residui aminoacidici)

Schemi della struttura secondaria (disposizione spirale con andamento sinistrorso con periodo di 8,7 Å) e terziaria (tre catene superspiralizzate con periodo di 90 Å)

● Idrossiprolina ● Prolina ● Glicina

C**TIPO I PROCOLLAGENE**

Schema di molecola di procollagene – la freccie indicano i siti di attacco degli enzimi proteolitici (collagenolitici) che liberando le porzioni amino e carbossil terminali realizzano la conversione del procollagene a tropocollagene

Schema base della molecola collagenica (tropocollagene)

Principali tipi di collagene nell'uomo

Schema della modalità di aggregazione delle molecole di tropocollagene (struttura quaternaria). La fibrilla, a simmetria esagonale, favorisce legami intermolecolari e tuttavia soddisfa il criterio dello sfasamento di $\frac{1}{4}$ di ciascun elemento.

B

A

C

● Idrossiprolina ● Prolina ● Glicina

<i>Tipo</i>	<i>Composizione</i>	<i>Sintetizzato da</i>	<i>Distribuzione</i>	<i>Caratteristiche</i>
FIBRILLARI				
I	$[\alpha 1(I)]_2 \alpha 2(I)$	fibroblasti, cellule reticolari, osteoblasti, odontoblasti	ossa, tendini, derma, dentina	rappresenta il 90% del collagene
I embrionale	$[\alpha 1(I)]_3$			particolarmente sensibile alla proteolisi
II	$[\alpha 1(II)]_3$	condroblasti, cellule mesenchimali, cellule della retina	cartilagine ialina ed elastica, dischi intervertebrali, umor vitreo	fibre sottili, alto contenuto di idrossilisina
III	$[\alpha 1(III)]_3$	fibroblasti, cellule reticolari	derma, connettivo lasso, vasi, muscolo	alto contenuto di idrossiprolina, ponti disolfuro tra le catene
V	$[\alpha 1(V)]_2 \alpha 2(V)$	cellule mesenchimali, fibroblasti, osteoblasti	connettivi fetali, membrane basali e come tipo I	associato al tipo I
ASSOCIATI A FIBRILLE				
IX	$\alpha 1(IX) \alpha 2(IX) \alpha 3(IX)$	condroblasti	cartilagine ialina ed elastica, umor vitreo	molecole corte (200 nm); mantiene i telopeptidi; associato al tipo II
XII	$[\alpha 1(XII)]_3$	cellule mesenchimali, fibroblasti	tendini e derma embrionali	mantiene i telopeptidi; associato al tipo I
LAMINARI O RETICOLARI				
IV	$[\alpha 1(IV)]_2 \alpha 2(IV)$	cellule epiteliali	membrane basali	
VIII	$[\alpha 1(VIII)]_2 \alpha 2(VIII)$	cellule endoteliali	endoteli	
X	$[\alpha 1(X)]_3$	condrociti ipertrofici	cartilagine di coniugazione	molecole corte (150 nm); dominio globulare C-terminale

Le cellule, le fibre collagene cementate e la matrice amorfa si dispongono nell'osso adulto ("*secondario*") a costituire sottili lamine ("*lamelle*"), che per formare l'osso si dispongono sovrapponendosi l'un l'altra

Osso *primario* non lamellare

Orientamento
irregolare delle
fibre collagene

Osso secondario *lamellare*

Lamelle di tessuto osseo
e fibre collagene rego-
larmente orientate

Modalità di organizzazione ed architettura dell'osso *primario* e dell'osso *secondario*

Osso compatto

(c) Osteone

Osso spugnoso