**TRATTAMENTO CHIRURGICO
DELL'IPERIDROSI DEGLI ARTI
SUPERIORI**

www.fisiokinesiterapia.biz

V.A.T.S.

VIDEO

ASSISTED

THORACIC

SURGERY

VATS

VATS

**DISGERMINOMA
MALIGNO**

V.A.T.S.

INDICAZIONI DIAGNOSTICHE

BIOPSIE LINFONODALI

MEDIASITINICHE

POLMONARI

PARETE TORACICA

VISUALIZZAZIONE CAUSA EMOTORACE

V.A.T.S.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- RESEZIONE ZONE POLMONARI BOLLOSE
- RESEZIONI ATIPICHE POLMONARI DI NEOFORMAZIONI BENIGNE
- COAGULAZIONE BLEBS
- ABRASIONE PLEURICA
- TALCAGGIO PLEURICO
- ASPORTAZIONE CISTI O NEOFORMAZIONI MEDIASTINICHE BENIGNE
- SIMPATICECTOMIA TORACICA
- ASPORTAZIONE NEURINOMI
- EVACUAZIONE EMPIEMI E DECORTICAZIONI PLEURICHE
- EMOTORACE POST TRAUMETICO
- STABILIZZAZIONI PARIETALI
- FINESTRE PERICARDICHE
- TIMECTOMIE
- LOBECTOMIA IN TUMORI POLMONARI STADIO IA

ENFISEMA INTERSTIZIALE GIOVANILE

CASISTICA (1975 – 2003)

N° CASI

TORACOTOMIE	199
VATS (dal 1993)	209
PLEUROSCOPIA E DRENAGGIO	1299
TOTALE	1707

PATOLOGIA BOLLOSA GIOVANILE (VATS / TORACOTOMIA)

	VATS	TORACOTOMIA
N° CASI	209	199
DRENAGGIO (g.g.)	2 ± 1	2 ± 1,5
OSPEDALIZZAZIONE	5	8 ± 1,7
COMPLICANZE	2	3
MORTALITA'	0	0
RECIDIVE	3	2

ENFISEMA BOLLOSO GIOVANILE
CONFRONTO VATS / TORACOTOMIA
DEFICIT FUNZIONALE RESPIRATORIO
II GIORNATA (% SPIROMETRIA)

	VATS	TORACOTOMIA
FEV₁	↓ 9 %	↓ 10 %
FEV₁/FVC	↓ 11 %	↓ 12 %
RV	↑ 8 %	↑ 7 %

ENFISEMA BOLLOSO GIOVANILE

CONFRONTO VATS / TORACOTOMIA

DEFICIT NEUROLOGICO

III GIORNATA (ELETTROMIOGRAFIA)

	COND. NORMALE	DEFICIT COND.	ASSENZA COND.
VATS	100%	-	-
TORACOT. CON RISPARMIO MUSCOLI	100%	-	-
TORACOT. SOTTOMAMMARIA	100%	30%	-
	ARTO SUP	M. DENTATO ANT.	M. GRANDE DORSALE

ENFISEMA BOLLOSO CRONICO

CASISTICA (1975 – 2003)

	N° CASI	COMPLICANZE	DECESSI
TORACOTOMIE	107	7	1 (0,93 %)
VATS (dal 1993)	68	6	0
TOTALE	175	13	1 (0,6 %)

ENFISEMA BOLLOSO CRONICO INDICAZIONE CHIRURGICA

N° CASI

**COESISTENTE
PNEUMOTORACE 123**

ELEZIONE 52

TOTALE 175

VATS-TORACOTOMIA

RESEZIONI IN VATS-TORACOTOMIA

2001

VATS
TORACOTOMIA

2002

VATS
TORACOTOMIA

2003

VATS
TORACOTOMIA

VATS

1 DRENAGGIO TORACICO

TORACOTOMIA

2 DRENAGGI TORACICI E RARAMENTE 1

**L'IPERIDROSI COSTITUISCE UN
PROBLEMA SOCIALE E LAVORATIVO
PER CIRCA L' 1% DELLA
POPOLAZIONE OCCIDENTALE, CON
RISVOLTI PSICOLOGICI MOLTO
SPESSO SOTTOVALUTATI**

6/2002-9/2005

678 simpaticectomie

339 pazienti

54,7 % iperidrosi palmare e plantare

26,9 % iperidrosi palmare ascellare e plantare

18,4 % iperidrosi ascellare pura

2 pazienti presentavano iperidrosi e blushing facciale

1 paziente era già stato trattato 2 volte con diatermocoagulazione in altra sede e recidivato

SIMPATICECTOMIA TORACICA BILATERALE IN UN UNICO TEMPO CHIRURGICO

ANESTESIA GENERALE

**ACCESSO ESTETICO
ASCELLARE (3 INCISIONI) CON
STRUMENTARIO DA 3 O 5 mm
CON ASPORTAZIONE DEL 2° ,
3° E TALVOLTA 4° GANGLIO
DEL SIMPATICO**

**SECONDA
COSTA**

SIMPATICO

RISULTATI

4 PZ CON ESTESE ADERENZE PLEURICHE LISATE CON TECNICA VIDEOASSISTITA SENZA RICORRERE A TECNICA APERTA

SUCCESSO TERAPEUTICO 99,4%

2 PZ HANNO RIPRESENTATO EPISODICHE SUDORAZIONI PALMARI, DESCRITTE COME SPORADICHE E DI INTENSITÀ VIA VIA DECRESCENTE

5/339 PZ HANNO RICHiesto IL MANTENIMENTO DI UN DRENAGGIO PRECAUZIONALE DI UN CAVO PLEURICO PER ALCUNE ORE DOPO L'INTERVENTO PER UNA INCOMPLETA RIESPANSIONE POLMONARE

3/339 PZ RIDRENAGGIO NEL POST-OPERATORIO ATTRAVERSO UNO DEGLI ACCESSI ASCELLARI NEL POSTOPERATORIO, CON SONDA DI NELATON, PER UNA INCOMPLETA RIESPANSIONE DOCUMENTATA ALL'RX TORACE DI CONTROLLO

RISULTATI

4 PZ DOLORE TORACICO SIGNIFICATIVO URENTE E LOCALIZZATO ALLA REGIONE INTERSCAPOLARE CHE HA RICHIESTO L'ASSUNZIONE DI ANALGESICI PER CIRCA 3 SETTIMANE.

1 PZ LIEVISSIMA SINDROME DI HORNER REGREDITA DOPO 36 ORE.

IL 16.5% PZ IPERIDROSI COMPENSATORIA TRANSITORIA (DURATA 3-6 MESI) LOCALIZZATA AL TRONCO, AL DORSO, INGUINI O COSCE.

RISULTATI

53,8% DEI PAZIENTI CON IPERIDROSI PLANTARE HA NOTATO UN MIGLIORAMENTO ANCHE IN TALE SEDE

99,7% DEI PAZIENTI SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DISPONIBILITÀ A RIPETERE O A CONSIGLIARE AD ALTRI L'INTERVENTO

CONCLUSIONI

- NELLA NOSTRA ESPERIENZA LA SIMPATICECTOMIA TORACICA VIDEO ASSISTITA PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERIDROSI PALMARE ED ASCELLARE HA DIMOSTRATO ESSERE METODICA CURATIVA E DEFINITIVA
- OFFRE AL PAZIENTE UN NETTO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI, LAVORATIVA E DEI RAPPORTI INTERPERSONALI
- BASSISSIMO RISCHIO DI COMPLICANZE E ZERO MORTALITÀ

CONCLUSIONI

METODICA SICURA ED AFFIDABILE

FONDAMENTALE

**INFORMAZIONE DETTAGLIATA SUI RISCHI E
SULLA POSSIBILITÀ DI SUDORAZIONE
COMPENSATORIA**

THORACIC SURGERY DIVISION OF
BRESCIA CIVIC HOSPITAL
EXPERIENCE IN SURGICAL
TREATMENT OF CONGENITAL CHEST
DEFORMATIONS: SUCCESSFUL
TREATMENT USING THE MODIFIED
RAVITCH PROCEDURE AND
MINIMALLY INVASIVE REPAIR OF
PECTUS
EXCAVATUM

MALFORMAZIONI CONGENITE PARETE TORACICA

Petto scavato (torace a imbuto, torace da calzolaio) 1: 300-400 nati vivi
M:F di 3-4:1

Petto carenato 1: 3000-4000 nati vivi M:F di 4:1

Sindrome di Poland (ipoplasia/aplasia di parte della parete toracica)

Schisi dello sterno

Coste soprannumerarie

1911 Mayer

1913 Sauerbruch

1952 Ravitch

1988 Nuss

-Rx torace

indice di MAX compressione

- Tc torace

**diametro trasversale /
diametro antero-posteriore
torace**

- Ecocardiogramma

- PFR

APRILE 1979 - APRILE 2006

63 PAZIENTI

52 PECTUS EXCAVATUM

10 CARINATUM

1 SINDROME DI POLAND

6-41 AA

52 MASCHI

11 FEMINE

TRATTAMENTO CHIRURGICO

Ravitch: sterno-condroplastica (57 pz)

(rimozione delle cartilagini costali interessate, liberazione e rimodellamento dello sterno con osteotomia trasversale cuneiforme del tavolo esterno sternale, appoggio su supporto)

Nuss: mininvasiva–VATS (6 pz)

9/2005 – 4/2006

5 M - 1 F ETÀ MEDIA 22,6 AA

SUPPORTO DI STABILIZZAZIONE TEMPORANEO

PLACCHE DI REBHEIN

SLIDING STAPLE-SPLINTS

PLACCHE ORTOPEDICHE

PLACCHE DI NUSS

SLIDING STAPLE-SPLINTS

O

PECTUS EXCAVATUM

PECTUS EXCAVATUM

**A VOLTE NECESSITÀ SECONDA
OSTEOTOMIA TRASVERSALE**

**IN 1 PAZIENTE UNA
STERNOTOMIA LONGITUDINALE
X ASSE STERNALE
PROFONDAMENTE ALTERATO**

Petto carenato

CONDRO GLADIOLARE SIMMETRICO

CONDRO GLADIOLARE ASIMMETRICO

MISTO ESCAVATO CARENATO

CONDRO MANUBRIALE

RIMOZIONE SUPPORTO

STERNOCONDROPLASTICA

8 - 20 MESI DALL'INTERVENTO

ECCEPTE 2 CASI

NUSS DOPO 3 ANNI

RISULTATI

MORTALITA': 0

MORBILITA' STERNOCONDROPLASTICA :

**1 CASO PARZIALE DEISCENZA DI ACCESSO
SOTTOMAMMARIO BILATERALE**

1 CASO VERSAMENTO PERICARDICO

1 CASO DI REVISIONE CAVO X EMOTORACE

MORBILITA' NUSS :

4 LIEVI PNX DX

2 LIMITATE ATELETTASIE POLMONARI DX

3 LIEVI ENFISEMI SOTTOCUTANEI IN SEDE D'INTERVENTO

RISULTATI

59 CASI OTTIMI

3 CASI BUONI

1 CASO MEDIOCRE risalente alle prime esperienze e
migliorato alla rimozione della placca

6/6 NUSS OTTIMI RISULTATI NEL NOSTRO FOLLOW UP

CATETERE EPIDURALE IMIEGATO IN 5/6 PAZIENTI

SCOMPARSA

RICORRENTI EPISODI RONCOPNEUMONICI

SALTUARI EPISODI ASMATIFORMI

DISPNEA E CARDIOPALMO DA SFORZO

INDICAZIONI AD INTERVENTO

DEFICIT FISIOPATOLOGICI CARDIO RESPIRATORI

PSICOLOGICI PER LA DEFORMITA'

**LA BASSA MORBIDITA' NELLA NOSTRA
ESPERIENZA GIUSTIFICA UNA INDICAZIONE
ANCHE SOLO PER FATTORI ESTETICI**

CONFRONTO PROCEDURE PER PECTUS EXCAVATUM

PROCEDURA MINI-INVASIVA
GARANTISCE

MINORE TRAUMA CHIRURGICO
MINORE DURATA INTERVENTO E DEGENZA
MINORE PERDITA EMATICA
INCISIONI PIU' ESTETICHE
DOLORE TENSIVO PIÙ PROLUNGATO
PIÙ VELOCE RIPRESA GRADUALE NORMALI
ATTIVITÀ COMPRESSE QUELLE SPORTIVE

**LA TECNICA MINIINVASIVA
VIDEOASSISTITA DI
CORREZIONE DEL PE SEC.
NUSS È EFFICACE ANCHE
OLTRE L'ETÀ PEDIATRICA**

**PROCEDURA MINI-INVASIVA E
STERNOCONDROPLASTICA**

OTTIMI RISULTATI CLINICI

SCELTA TECNICA CHIRURGICA SECONDO

**ETÀ
TIPO**

MALFORMAZIONE